

## Pijnlijke zwelling in de lies

Carolien Bouwman,  
arts-assistent chirurgie, ZGT  
Hengelo

Wouter ten Cate,  
chirurg, ZGT Hengelo

beeld: auteur

Een 83-jarige vrouw presenteert zich met al langer bestaande pijnklachten in de rechterlies. Sinds vijf dagen heeft zij ook een zwelling ter plaatse bemerkt. Bij lichamelijk onderzoek wordt een pijnlijke, vaste, niet reponibele zwelling in de rechterlies gevoeld. Bij echografie wordt een beeld gezien verdacht voor een beklemde liesbreuk rechts, met in de breukzak een darmliis. Er wordt besloten de breuk direct operatief te herstellen.

Er wordt gekozen voor endoscopisch herstel door middel van een TEP (Totale Extraperitoneale Procedure). Peroperatief blijkt het om een beklemde femoraalbreuk rechts te gaan. In de breukzak wordt een necrotische appendix gezien. Omdat er geen aanwijzingen zijn voor een appendicitis acuta, wordt de breuk met behulp van een mesh gecorrigeerd. Vervolgens vindt een laparoscopische appendectomie plaats. Perioperatief krijgt patiënte Augmentin. Patiënte wordt na zestien dagen poliklinisch gecontroleerd. Zij is klachtenvrij; de Augmentin wordt gestopt en de controles worden beëindigd.

Een hernia femoralis waarbij in de breukzak de appendix wordt gezien, heet een De Garengéot-hernia, naar de ontdekker de Franse chirurg René-Jacques Croissant de Garengéot.<sup>1</sup> Van alle hernia's die gediagnosticeerd worden, betreft het in 3 procent van de gevallen een hernia femoralis.<sup>2</sup> In 0,8 tot 1 procent van de gevallen wordt in de breukzak de appendix aangetroffen.<sup>3,4</sup> Dit maakt de diagnose De Garengéot-hernia uiterst zeldzaam. Dit type hernia wordt vrijwel uitsluitend bij vrouwen gezien.<sup>5</sup> De diagnose wordt meestal peroperatief gesteld. Patiënten presenteren zich vaak met buikklachten en een pijnlijke zwelling in de lies. De behandeling bestaat uit het verrichten van een appendectomie en het sluiten van de breukpoort, open of endoscopisch. Over de volgorde verschillen de meningen.<sup>6</sup> Indien er sprake is van een appendicitis acuta wordt aanvankelijk alleen een appendectomie verricht en wordt de hernia later hersteld. Indien er geen sprake is van een appendicitis heeft direct herstel van de hernia met een mesh de voorkeur.



De voetnoten vindt u bij dit artikel op [www.medischcontact.nl](http://www.medischcontact.nl)



In de breukzak wordt een necrotische appendix gezien.



### Schrijf een casus en win een boek!

*Dokters voor de rechter* bevat tien jaar tuchtuitspraken, thematisch gebundeld, deskundig commentariseerd en vol treffende citaten.

Gratis exemplaar verdienen? Schrijf dan in maximaal 300 woorden een casus voor de rubriek Gezien (vergeet niet een foto bij te voegen). Als uw inzending wordt geplaatst, ontvangt u *Dokters voor de rechter*. Stuur uw casus naar [redactie@medischcontact.nl](mailto:redactie@medischcontact.nl).

[www.medischcontact.nl/gezien](http://www.medischcontact.nl/gezien)