

Een tumor met een staartje...



Pijl geeft een radiopaque structuur aan, grenzend aan de onderste halswervelkolom.



Een aparte controleröntgenopname van het haar in een knot.

Een 11-jarig meisje komt naar de poli Orthopedie vanwege een zwelling in haar nek. Zij had geen pijn of ongemak. Bij lichamelijk onderzoek was sprake van een prominente processus spinosus van de zevende cervicale wervel. Ze kon haar nek volledig pijnvrij bewegen. Röntgenonderzoek onthulde meerdere, deels sclerotische, scherp begrensde, bolvormige laesies in de subcutane weke delen ter hoogte van de onderste halswervel (zie foto 1). Na aanvankelijke verdenking op een wekedelentumor, besloten we om een haarartefact uit te sluiten. Er werd een nieuwe röntgenopname gemaakt waarbij ze het haar in een knotje droeg in plaats van de geknoopte paardenstaart. Bij dit tweede röntgenonderzoek waren geen laesies meer zichtbaar. Een röntgenopname van het knotje (zie foto 2) bevestigde dat de sclerotische laesies te wijten waren aan een haarvlechtartefact. De initiële zwelling in de nek bleek een gevolg van een prominente zevende cervicale wervel.

Bij twijfelachtige sclerotische laesies in de differentiaaldiagnose moet dus ook rekening worden gehouden met corpora aliena die zich tussen de röntgenbuis en de film bevinden. Alles wat kan interfereren (zoals vlechtten) moet door de patiënt of een laborant uit de weg worden gehouden, of opgeknoopt zoals in deze casus. ■

contact

antonhosman@gmail.com;
cc: redactie@medischcontact.nl

Heeft u ook een interessante casus voor deze rubriek?

Stuur tekst (max. 300 woorden) en beeld naar
redactie@medischcontact.nl.

Wat ziet u?



Een 78-jarige patiënt krijgt tijdens het maken van een CT-colon plots hevige pijn in de onderbuik. Wat ziet u op de CT-colon?

U kunt reageren op medischcontact.nl/watzietu.



Het antwoord vindt u
volgende week in
Medisch Contact.