

Willemijn Koop

aios plastische chirurgie, Medisch
Centrum Leeuwarden

Eduard Verschuur

plastisch chirurg, Medisch
Centrum Leeuwarden en Bergman
Clinic Heerenveen

Pijnlijke strengen na borstvergroting

Een gezonde 36-jarige vrouw meldt zich bij haar operateur in verband met pijnlijke strengen onder haar linkerborst na een esthetische mamma-augmentatie beiderzijds met siliconenprothesen. Het postoperatieve beloop is aanvankelijk ongecompliceerd, totdat zij na twee weken pijn

krijgt onder haar linkerborst en daar drie strengen bemerkt. De pijn neemt toe bij aanraking. De klachten zijn niet cyclusgebonden en de familieanamnese voor mammacarcinoom is negatief. Rechts heeft zij geen klachten.

Bij lichamelijk onderzoek zien wij een geaugmenteerde linkerborst met caudaal drie huidkleurige strengen. Deze zijn subcutaan, beginnen in het inframammair geplaatste litteken en verlopen verticaal. De strengen zijn pijnlijk en hard bij palpatie. De mediale en langste streng meet 1 bij 17 centimeter, de twee meer lateraal gelegen strengen meten 1 bij 3 centimeter. Bij palpatie van de borst is er een normale postoperatieve situatie. Patiënte heeft geen koorts en er zijn geen axillaire lymfeklieren palpabel. Op basis van het klinisch beeld wordt de diagnose ziekte van Mondor gesteld. Er wordt een terughoudend beleid gevolgd met NSAID's. Na zes weken zijn de strengen verdwenen en is patiënte klachtenvrij.

De ziekte van Mondor is een zeldzame aandoening die in twee tot tien weken

vanzelf overgaat.¹ Er is sprake van een trombo-flebitis van een subcutane vene van de anterolaterale thoraco-abdominale wand, maar ook andere oppervlakkige venen kunnen aangedaan zijn.² Door de inframammair incisie van de mamma-augmentatie worden de verticaal georiënteerde venen doorgenomen en kan er stase van bloed en mogelijk trombusvorming ontstaan.³ Er vormt zich een streng of intrekking. Andere beschreven oorzaken zijn zwangerschap, infectie, trauma of mammacarcinoom.⁴ De diagnose wordt gesteld op basis van het klinisch beeld. Echografie en mammografie kunnen aanvullend zijn. Omdat de ziekte van Mondor zelflimiterend is, is er geen noodzaak tot behandeling. Eventueel kunnen wel NSAID's worden voorgeschreven. ■

contact:

willemijn.koop@znb.nl
cc: redactie@medischcontact.nl

De voetnoten vindt u bij deze casus op medischcontact.nl/gezien.

Heeft u ook een interessante casus voor deze rubriek?

Stuur tekst (max. 300 woorden) en beeld naar redactie@medischcontact.nl.

Wilt u vast meedenken over de casus van volgende week? medischcontact.nl/wat_ziet_u.



BEELD AUTEURS

Enige tijd na de borstvergroting ontstaan huidkleurige strengen onder de linkerborst, die pijnlijk en hard zijn bij palpatie.