

Jim Smithuis
coassistent

Laurens Schols
coassistent

Kees Korver
kinderarts
allen in het Kennemer Gasthuis,
Haarlem

Vervellende zuigeling

Een drie weken oude zuigeling werd op de SEH gepresenteerd met sinds een dag ontvelling van de huid.

Het ziektebeeld was acht dagen daarvoor begonnen met een rinitis. Drie dagen later ontwikkelde zich tevens een conjunctivitis en een schilferige huid met crustae rond de mond, uitbreidend naar het hele gelaat. Een dag later werd het meisje gepresenteerd op de huisartsenpost waarop met hydrocortison en vaseline werd gestart onder de verdenking van seborroïsch eczeem. Omdat de klachten aanbleven en een bijkomende vervelling optrad, werd het meisje vier dagen later naar de SEH gebracht. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een alerte zuigeling. In het gelaat bevonden zich erythematueze papels met wat vervelling. De linkerbovenarm en deel van de ventrale thorax toonde een confluërend, vurig rode huid met vervelling. Er werd geen koorts gemeten. Huidkweken afgenomen uit de blaren

toonden een *Staphylococcus aureus*. Onder de werkdiagnose staphylococcal skalded-skin syndrome (SSSS) werd gestart met intraveneuze toediening van flucloxacilline. Hierop verbeterde het klinisch beeld binnen enkele dagen. SSSS is een ernstige huidinfectie met als kenmerk loslaten van de huid (*skalded-skin*). Boven de leeftijd van 5 jaar is het syndroom zeldzaam en komt dan vooral voor bij immuun-gecompromiteerde patiënten. Het subtype stafylokok dat het syndroom veroorzaakt produceert een op de epidermis inwerkend toxine. Het toxine verbreekt de verbinding tussen keratinocyten, resulterend in het loslaten van de epidermis. Blaren die overgaan in ontvelling, ontstaan voornamelijk op plekken waar veel wrijving is zoals gewrichten, billen, handen en voeten. Dit beeld kan worden uitgelokt door lichte druk op de huid te geven, resulterend in separatie van een deel van de epidermis en rimpeling van de huid (Nikolsky's sign).

De aangewezen therapie voor SSSS is intraveneuze toediening van antibiotica in combinatie met lokale applicatie van een ondersteunende zalf of crème om de barrièrefunctie van de huid te herstellen. ■

contact
jimisin@gmail.com
cc: redactie@medischcontact.nl

Heeft u ook een interessante casus voor deze rubriek?

Stuur tekst (max. 300 woorden) en beeld naar redactie@medischcontact.nl.

Wat ziet u?



Een meisje van 1 jaar trekt een stukje weefsel weg bij haar anus. Wat kan dit zijn?

U kunt reageren op medischcontact.nl/wat_ziet_u.

